

# ການລ້ຽງ ງົວທອມ

## ຈຸດປະສົງ:

ລ້ຽງເພື່ອເປັນແຮງງານລາກແກ່, ເປັນເງິນສະສົມຂອງຄອບຄົວ, ການໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນ: ປູກເຮືອນ, ຍາມເຈັບເປັນ, ສົ່ງລູກເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ອື່ນໆ.

## ຮູບແບບການລ້ຽງ:

- ◆ ລ້ຽງແບບປ່ອຍຕາມທີ່ງົວທອມທຳມະຊາດ ແລະ ທີ່ງົວພາຍໃນບ້ານ.



- ◆ ລ້ຽງແບບປະສົມປະສານກັບການປູກພືດ.
  - ທີ່ງົວທອມລວມບ້ານ, ທີ່ງົວທອມປູກເອງ.
  - ລ່າມໃນຄັງທອມ.
  - ຂັງໄວ້ໃນຄອກຕັດທອມໃຫ້ກິນ.

- ◆ ລ້ຽງປະສົມປະສານກັບການປູກຕົ້ນໄມ້, ໄມ້ກິນໝາກ.

## ແຫລ່ງອາຫານທີ່ສຳຄັນສຳລັບສັດຄ້ຽວເອື້ອງ:

- ໄດ້ຈາກທີ່ງົວທອມທຳມະຊາດ, ໃບໄມ້ ແລະ ເພືອງແຫ້ງ ແຕ່ອາຫານໄດ້ຈາກແຫລ່ງດັ່ງກ່າວມີຜົນຜະລິດຕໍ່າ 2—2,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ/ປີ.
- ໄດ້ຈາກການປູກຕົ້ນໄມ້ອາຫານສັດຕາມແລວຮິ້ວບ້ານໜ້າສວນຫົວໄຮ່ປາຍນາເຊັ່ນ: (ກະຖິນ, ແຄຂາວ, ແຄຝຣັ່ງ, ຕົ້ນເຕືອ)

ປ່ອງ) ພຶດອາຫານສັດດັ່ງກ່າວຈະ ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງກ່ວາທີ່ງົວທອມທຳມະຊາດເຖິງ 98%.

- ການປູກພືດຕະກູນຖົ່ວ (ສະຕາຍໂລ, ເຊັນໂຕຣ, ອາ ກາເຊັຍ, ກະຖິນ, ຈຳພວກຖົ່ວຂຽວ, ຖົ່ວເຫືອງ, ຖົ່ວແຮ ) ຈຳພວກຖົ່ວດັ່ງກ່າວຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ສັດມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ, ໄດ້ນ້ຳ ໜັກດີ.
- ໄດ້ຈາກພື້ນທີ່ປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫະກຳ (ສວນປູກຕົ້ນຜ້າວ, ສວນໝາກກ້ຽງ, ຢາງພາລາ).

## ການລ້ຽງງົວທອມ:

1. ພັນງົວທີ່ນຳມາລ້ຽງຄວນແມ່ນພັນປະສົມເຊັ່ນ: ລູກຊອດງົວພັນບຣາມັນ ແລະ ຊາໂລເລ ຫລື ບຣາ ມັນປະສົມກັບງົວລາດ ເພາະລູກຊອດຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ.
2. ງົວທີ່ເອົາມາລ້ຽງທອມຕ້ອງ ມີອາ ຍຸປະມານ 17—18 ເດືອນ.
3. ໄລຍະທອມປະມານ 6 ເດືອນ. , ໃຊ້ອາຫານທີ່ມີທາດຊີ້ນສູງ ຈຳພວກ ສາລີ , ຮຳ, ມັນຕົ້ນ, ໃບກະຖິນ ແລະ ຈຳພວກທອມສິດສະ ເລ່ງນ້ຳໜັກເພີ່ມປະມານ 800—1,000 ກຣາມ ຕໍ່ ມື້, ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຖ້າທຽບໃສ່ຈຳນວນອາຫານທີ່ລ້ຽງແມ່ນ 8:1, ສະເລ່ງຊີ້ນສິດ 61% ຂອງ ນ້ຳໜັກໂຕເປັນ.



ຮູບ: ງົວລູກຊອດ ພັນບຣາມັນ

## 4. ສູດອາຫານງົວທອມ

- ມັນຕົ້ນ 55 ກິໂລ — ແປ່ງສາລີ 15 ກິໂລ
- ຮຳ 15 ກິໂລ — ໃບກະຖິນ 10 ກິໂລ
- ປຸຍຢູເຣັຍ 2,5 ກິໂລ — ກະດູກປືນ 2 ກິໂລ
- ເກືອ 0,5 ກິໂລ


ຕາຕະລາງ: ການໃຫ້ອາຫານ ( ກິໂລ/ໂຕ/ມື້ )  
ໃຫ້ອາຫານ ແລະ ຫຍ້າສິດ 2 ເທື່ອ/ ມື້

ນ້ຳໜັກສັດ (ກິໂລ)	200	250	300	350
ອາຫານ (ກິໂລ)	3	3,5	4	5

## ພະຍາດຕົ້ນຕໍ ຂອງງົວ, ຄວາຍ

ພະຍາດທີ່ນັກເກີດມີ ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ, ພະຍາດໄຂ້ເລືອດດຳ, ພະຍາດທ້ອງເບັງ, ພະຍາດປາກເປື້ອຍລົງເລັບ ພະຍາດແຫ້ງຕິດຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ.

ພະຍາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ງົວ, ຄວາຍຕາຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ປະຈຸບັນກໍຄ່ອຍໆຫລຸດລົງ ເພາະປະຊາຊົນເຮົາໄດ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນ..



ຮູບ: ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ

**ການສັກວັກຊີນທີ່ໄດ້ຜົນຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:**

1. ຕ້ອງສັກວັກຊີນໃຫ້ສັດຕາມກຳນົດເວລາເປັນປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ສັດມີພູມຄຸ້ມກັນໃນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດ ສັດຈະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃນໄລຍະ 2 ອາ ທິດ ຫລັງຈາກສັກວັກຊີນແລ້ວ.
2. ຕ້ອງຮູ້ວິທີການເກັບຮັກສາ ແລະ ວິທີໃຊ້ວັກຊີນແຕ່ລະຊະນິດເປັນຢ່າງດີ.



**ການປ້ອງກັນພະຍາດ ດ້ວຍມາດຕະການທາງການດັ່ງນີ້ :**

- ◆ ກ່ອນຈະນຳສັດໃໝ່ເຂົ້າມາລ້ຽງໃນຝູງ ຕ້ອງແນ່ ໃຈວ່າສັດນັ້ນບໍ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດເຊັ່ນ: ພະຍາດແທ້ງລູກຕິດຕໍ່, ພະຍາດວັນນະໂລກ
- ◆ ລະວັງການເຂົ້າອອກຂອງສັດ,ຄົນ ແລະ ຍານພາຫະນະ ຜ່ານເຂດທີ່ມີເຊື້ອພະຍາດລະບາດ ເພາະອາດຈະຕິດເຊື້ອມາແຜ່ໄດ້.
- ◆ ເມື່ອພົບວ່າມີສັດເຈັບຫາກສົງໃສວ່າເປັນພະຍາດຕິດຕໍ່ໃຫ້ແຍກສັດເຈັບນັ້ນອອກຈາກຝູງ ແລະ ຫຳການປິ່ນປົວ, ສິ່ງຂັບຖ່າຍຈາກສັດເຈັບຕ້ອງກຳຈັດ ໂດຍການຝັງ ແລະ ເຜົາ ຫລື ໃຊ້ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອສິດໃສ່ພາຍໃນຄອກ ແລະ ບໍລິເວນຄອກ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ

- ◆ ບໍ່ຄວນກິນຊີ້ນສັດເຈັບ ຫລື ຕາຍເພາະອາດເປັນພະຍາດທີ່ຕິດຄົນໄດ້ ເນື່ອມີສັດຕາຍແບບຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ລາຍງານສັດຕະວະແພດມາກວດເບິ່ງຊາກສັດຫັນທີ, ຖ້າບໍ່ມີການກວດກາພະຍາດໃຫ້ ຫຳລາຍຊາກພ້ອມກັບສິ່ງຂັບຖ່າຍ ໂດຍການຈູດ ຫລື ຝັງໃຫ້ເລິກໆ ແລະ ເອົາປູນຂາວໂຮຍໃສ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ.



Supported by  
**Laos Extension for Agriculture Project**  
 P.O. Box 9159  
 Vientiane, Lao P.D.R.

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ  
 ສູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າ



# ການລ້ຽງງົວທອມ



ຫນ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າ

ໂທລະສັບ: (021) 621018  
 ແຟກ: (021) 621018  
 EMail : lec@laotel.com

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ : ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)