

ການລ້ຽງໄກ່ເຫລືອງ

ໄກ່ເຫລືອງ,ເປັນພັນທີ່ລ້ຽງງ່າຍ,ໃຫຍ່ໄວ,ເໝາະສົມກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງບ້ານເຮົາ.ຈຸດພິເສດຂອງໄກ່ເຫລືອງໃຫ້ໄຂ່ ຫລາຍກ່ວາໄກ່ ລາດ, ສາມາດໃຫ້ໄຂ່ປະມານ 150 ໜ່ວຍ ຕໍ່ປີ.

ການເລືອກສະຖານທີ່:

ຕ້ອງເປັນບ່ອນຫ່າງໄກຈາກຊຸມຊົນ, ເປັນບ່ອນດິນໂນນ ນ້ຳບໍ່ຖ້ວມ,ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ, ມີຕົ້ນໄມ້ບັງແດດໃນຕອນທ່ຽງ, ມີເດີນຫຍ້າໃຫ້ໄກ່ໄດ້ຫາກິນ, ເປັນບ່ອນທີ່ມີອາກາດປອດໂປງບໍ່ເຄີຍເກີດພະຍາດມາກ່ອນ.

1. ການສ້າງຄອກໄກ່:

ຫລັງຄາອາດມຸງດ້ວຍຫຍ້າຄາ, ສັງກະສິຫລື ຝ້າຫລັງຄາ ສູງຢ່າງນ້ອຍ 1,80 ແມັດ, ຜິ້ນຄອກຄວນເອົາຂີ້ແກບ ຂີ້ເລື່ອຍ ມາໃສ່ໃຫ້ໜາປະມານ 5 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອດູດຊີມນ້ຳຈາກຂີ້ໄກ່ເຮັດໃຫ້ຜິ້ນຄອກແຫ້ງສະອາດດີປ້ອງກັນພະຍາດ.




ຮູບ1: ຄອກໄກ່ຫຼັງຄາຫຍ້າຈິວ

ຮູບ:



ຮູບ2: ເທີບໝາແໜງນຸນກ່າຍ



ຮູບ3: ເທີບໝາແໜງນຸນ

ອຸປະກອນສຳລັບລ້ຽງໄກ່:



1. ຮາງອາຫານ



2. ຮາງນ້ຳ



3. ຮັງໄຂ່(ໃຊ້ກະຕ່າຫລື ວັດສະດຸອື່ນໆ)



4. ຄອນນອນ

2. ການຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນ:

ການຄັດເລືອກໄກ່ເຮັດເປັນພໍ່ແມ່ພັນ ຕ້ອງເລືອກຈາກພໍ່ແມ່ພັນທີ່ມີ ລັກສະນະຄຸນສົມບັດຄື:

ເລີ້ມໄຂ່ໄວ(ອາຍຸ 23—28 ອາທິດ) ໜ້າຕາແຈ່ມໃສ, ໂຕໃຫຍ່, ຫອນ ແລະ ຕ້າງສີແດງ, ລ້ຽງລູກດີ, ພັກໄຂ່ເກັ່ງ, ກະດູກຜັງກີ້ນກ້ວາງ

ສຳລັບພໍ່ພັນ ປະສົມພັນເກັ່ງ,ຄວນປ່ຽນພໍ່ພັນທຸກໆ 2 ປີ ຫລືກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ພໍ່ປະສົມພັນກັບລູກມັນເອງ.



ໄກ່ໄຂ່ດີຂຶ້ນຂາດສ້ອຍ

3. ການອະນຸບານໄກ່ນ້ອຍ:

ໄກ່ນ້ອຍແຕກໃໝ່ຕ້ອງການອຸນ ຫະພູມ 36—37 ອົງສາ, ເຮົາຕ້ອງເຮັດຄອກອະນຸບານໄກ່ນ້ອຍ, ໂດຍໃຊ້ຝາກະແຕະມາຂີດເປັນວົງມືນ ກ້ວາງ 1,20 ແມັດ, ສູງ 60 ຊັງຕີແມັດ ຫລື ໃຊ້ຈຳພວກໄມ້ໄຜ່ມາເຮັດເປັນ ຄອກ, ໃສ່ ດອກໄຟ 100 ວັດ 2—3 ດອກຕໍ່ໄກ່ນ້ອຍ 100 ໂຕ, ຕ້ອງໃຫ້ນ້ຳໄກ່ນ້ອຍບໍ່ໃຫ້ຂາດ.



ຄອກອະນຸບານໄກ່ນ້ອຍ

4. ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ

ອາຫານໄກ່ໄດ້ມາຈາກ 3 ແຫລ່ງຄື: ໄດ້ຈາກພືດ, ຈາກສັດ ແລະ ຈາກແຮ່ທາດຕ່າງໆ, ອາຫານໄກ່ປະກອບດ້ວຍ 4 ທາດໃຫຍ່ຄື:

ທາດພະລັງງານ: ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ສາລີ, ຮຳ, ເຂົ້າປຽນ, ຫົວມັນ ຕົ້ນ ແລະ ຫົວມັນຕ່າງໆ.



ຮຳ



ສາລີ



ມັນຕົ້ນ

ທາດຊີ້ນ: ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ຊີ້ນ, ປາ, ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ແລະ ພືດຕະກູນຖົ່ວຕ່າງໆ, ທາດຊີ້ນເຮັດໃຫ້ໄກ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ.

ແຮ່ທາດ: ໄດ້ຈາກຈຳພວກ ກະດູກ, ປັໜອຍ, ປີ້ໄຂ່, ໄກ່ຕ້ອງການແຮ່ທາດເພື່ອສ້າງໂຄງກະດູກໃຫ້ແຂງແກ່ນ, ສ້າງປີ້ໄຂ່ອີກດ້ວຍ, ນອກນັ້ນຍັງເປັນສ່ວນປະກອບຂອງທາດຊີ້ນ, ເມັດເລືອດ ແລະ ແພຈຸລິງຕ່າງໆ.

ທາດວິຕາມິນ: ໄດ້ມາຈາກຈຳພວກພືດສີຂຽວ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຈາກນ້ຳມັນ, ຕົບສັດ, ຊີ້ນປືນ, ນ້ຳມັນ

ສູດອາຫານໄກ່:

ວັດຖຸດິບ	ນ້ຳໜັກ (ກິໂລ)	%ທາດຊຸ່ມ ໃນວັດຖຸດິບ	%ທາດຊຸ່ມ ໃນອາຫານ
ສາລີ, ເຂົ້າປຽນ	45	0,08	3,60
ຮຳອ່ອນ	25	0,10	2,50
ຖົ່ວເຫລືອງ	10	0,40	4,00
ປາປືນ	8	0,50	4,00
ໃບກະຖິນ	4	0,17	0,68
ກະດູກປືນ	7,7	0,71	0,53
ເກືອ	0,3		
ລວມ	100		15,31

ອັດຕາການໃຫ້ອາຫານໄກ່

ອາຍຸໄກ່	ຈ/ນອາຫານ (ກຣາມ/ມື້/ໂຕ)	ນ້ຳ (ມິນລິລິດ/ມື້/ໂຕ)
1 ມື້—2ອາທິດ	20	40
15ມື້—1 ເດືອນ	40	80
1 — 2 ເດືອນ	70	102
2—3 ເດືອນ	100	150
3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ	120	200

5. ພະຍາດ

ພະຍາດນິວຄາເຊີນ:

ແມ່ນພະຍາດຮ້າຍແຮງ ເກີດຈາກເຊື້ອໂວຣັດ ມັກເກີດກັບໄກ່ສະເພາະ, ໄກ່ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ຈະຕາຍເຖິງ 80—100%, ອາການທີ່ສະແດງອອກຄືໄກ່ຈະຕາຍຢ່າງກະທັນຫັນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍໄກ່ຈະຈາມ, ຫັນໃຈຍາກ, ອາຈິມ ເປັນສີຂຽວແກມເຫລືອງ, ຮ່າງກາຍບາງສ່ວນເປັນອຳນະພາດ, ໄກ່ໂຕທີ່ລອດຕາຍຈະຄໍບິດຍ່າງເປັນວົງ ວຽນ, ພະ ຍາດນີ້ປົວບໍ່ໄດ້, ຕ້ອງປ້ອງກັນດ້ວຍວັກຊີນນິວຄາເຊີນຄື:

ວັກຊີນນິວຄາເຊີນອາຍຸອ່ອນໃຊ້ຢອດ ດັ່ງ, ຕາໄກ່ນ້ອຍ 2—3 ຢອດ ແລະ ນິວຄາເຊີນອາຍຸແກ່ສັກກ້າມຊີ້ນໄກ່ ອາຍຸ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ, ຄຸ້ມກັນໄດ້ 1 ປີ.



Supported by
Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ສູນສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າ



ເຕັກນິກ ການລ້ຽງໄກ່ເຫລືອງ



ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກດ້ານການລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າ

ໂທລະສັບ: (021) 621018

ແຟກ: (021) 621018

Email : lec@laotel.com

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)