

# ການນຳໃຊ້ ຢາວັກຊີນໄຂ້ບວມ

## ນິຍາມ:

ວັກຊີນຊະນິດນີ້ ປຸງແຕ່ງມາຈາກທາດເບື້ອ ຂອງເຊື້ອ *CLOSTRIDIUM CHANVOEI* ເຊິ່ງປູກໃນພູມທີ່ບໍ່ມີອາກາດ ແລະດັດແກ້ທາດເບື້ອດ້ວຍຟອກໂມນ. ເປັນວັກຊີນເຊື້ອຕາຍຊະນິດນ້ຳ ປະກອບດ້ວຍອາລູມິນຽມ ໂຣດຣິກຊາຍເຈນ ເປັນສານເສີມພະລັງ.

## ລັກສະນະອາການ

ສັດ ເຊັ່ນ : ງົວຄວາຍ, ແກ້, ແບ້ ມັກຕາຍ, ມີອາການໄຂ້ສູງ, ໄຂ້ຕາມກ້າມຊີ້ນ, ບ່າໄລ່, ກະໂພກບົບເບິ່ງບ່ອນໄຂ້ນີ້ຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງ ຂອງຝອດອາກາດ. ສັດຈະຕາຍພາຍໃນ 5 ຫາ 6 ຊົ່ວໂມງ.



## ຂໍ້ແນະນຳ:


- ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ບວມ ງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້
- ງົວ, ຄວາຍ ອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.
- ແກະ, ແບ້ ອາຍຸ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ.

## ວິທີໃຊ້:

- ສົ່ນໃຫ້ລະລາຍກ່ອນໃຊ້.
- ງົວ, ຄວາຍສັກ 3 ມລ.
- ສັກຫຼືບໜັງ.



- ແກະ, ແບ້ ສັກ 2 — 3 ມລ.
- ສັກຫຼືບໜັງ. ຫຼັງຈາກສັກຢາຈະມີອາການໄຄ່ເລັກນ້ອຍ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນບ່ອນສັກຢາ ພາຍໃນໄລຍະ 2 — 3 ມື້.



## ໄລຍະຄຸ້ມກັນ:

ສັດຈະຄຸ້ມກັນ ພາຍຫຼັງສັກຢາໄດ້ 2 ອາທິດ ແລະ ຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້ 1 ປີ.

## ການເກັບຮັກສາ:

ຮັກສາໃນອຸນນະພູມ 4 ອົງສາ. ກຸ້ມໄດ້ 1 ປີ ເວລາຂົນຍ້າຍວັກຊີນ ຫຼືກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ ແລະ ອຸນນະພູມ ອົບເອົາເກີນໄປ.

ແກ້ວບັນຈຸ: ແກ້ວໜຶ່ງບັນຈຸ 100 ມລ / 30 ເຂັ້ມ.

ຕາຕະລາງ : ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ ໄຂ້ບວມ

ຊະນິດຢາວັກຊີນ	ອາຍຸສັດຕ້ອງໃຊ້	ວິທີໃຊ້	ໄລຍະຄຸ້ມກັນ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ຢາວັກຊີນ ໄຂ້ບວມ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ໃຊ້ກັບ ງົວ, ຄວາຍ (ອາຍຸ 6 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ).</li> <li>ແກະ, ແບ້ (ອາຍຸ 3 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ງົວ, ຄວາຍ (ສັກ 3 ມລ. ແລະ ສັກຫຼືບໜັງ)</li> <li>ແກະ, ແບ້ (ສັກ 2—3 ມລ. ສັກຫຼືບໜັງ).</li> </ul>	1 ປີ

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ  
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



# ການນຳໃຊ້ ຢາວັກຊີນໄຂ້ບວມ



ຄັດຈາກ: ປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ວັກຊີນສຳລັບສັດ (1997)

ຮຽບຮຽງໂດຍ :

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ (CETD/L)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)



Laos Extension for Agriculture Project  
P.O. Box 9159  
Vientiane, Lao P.D.R.