

1. ພະຍາດນິວຄາເຊິນອາຍຸອ່ອນ

ເປັນພະຍາດລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງ (ຜູ້ລ້ຽງຄວນລະວັງ)

• ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດນິວຄາເຊິນ

ພະຍາດນິວຄາເຊິນແມ່ນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງສຳລັບໂກ່ ຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັດ, ຊຶ່ງນັບວ່າ ເປັນພະຍາດ ນ້ຳເບີນຶ່ງຂອງໂກ່ທີ່ເກີດຢູ່ໃນປະເທດລາວເຮົາ.

• ອາການຂອງໂກ່ທີ່ເປັນພະຍາດ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖ້າຫາກໄດ້ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງ ກ່າວກໍ່ຈະສະແດງອາການຄື: ເທົາ ແລະບໍ່ກິນອາຫານ, ມັກ ຢືນຈຸ່ມກັນເປັນໝູ່, ຫາຍໃຈຢາກເພາະມີນ້ຳລາຍອັ່ງອໍຕາມ ປາກ ແລະລຳຄໍ, ໃນໄລຍະທຳອິດອາຈົມຍິ່ງມີລັກສະນະ ເປັນກ້ອນຕໍ່ມາເປັນນ້ຳສີຂາວປົນສີນົມ, ຢູ່ຕາມຫາງມັກມີອາ ຈົມຕິດ 2 ຫາ 3 ມື້ ຕໍ່ມາໂກ່ກໍ່ຈະຕາຍ, ສ່ວນເປີເຊັນຂອງ ການຕາຍແມ່ນສູງເຖິງ 100 %.



ຮູບ: ອາການຂອງໂກ່ທີ່ຕິດພະຍາດ

• ການຕິດຕໍ່ຂອງພະຍາດ

ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍທາງ ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນທາງລົມ ແລະ ຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍຜ່ານພາຫະນະເຊັ່ນ: ຄົນ ໂດຍການ ສຳພັດ ແລະຈາກເຊື້ອປົນເປື້ອນໃນອາຫານ ແລະນ້ຳ, ໃນ ບາງກໍລະນີທີ່ມີການຕິດເຊື້ອຢ່າງກະທັນຫັນ, ອາດຈະບໍ່ປະ ກົດອາການພຽງແຕ່ຈະເຫັນວ່າໂກ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເລີ້ມມີອາ ການລະບົບຫາຍໃຈໄວ, ຊຶ່ງເຫຼີງານອນໝູນ, ບໍ່ກິນອາຫານ, ອ້າປາກຫາຍໃຈ, ຈາມ, ຂອບຕາບວມ, ນ້ຳຕາໄຫຼ, ນ້ຳໜູກ ໄຫຼ, ມີບາງໂຕຄໍປິດ ແລະຂາລ່ອຍ.

• ການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ

ພະຍາດນີ້ ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປ້ອງ ກັນເຊັ່ນ: ການອະນາໄມຄອກ, ໂຮຍປູນຂາວ, ແຍກໂກ່ທີ່ ເປັນພະຍາດ, ປ້ອງກັນການແຜ່ລາມຈາກໂກ່ທີ່ເປັນພະຍາດ ຈາກບ່ອນອື່ນເຂົ້າມາລ້ຽງ, ນອກຈາກການປ້ອງກັນ ທີ່ໄດ້ ກ່າວມາໃນຂ້າງເທິງແລ້ວນັ້ນພະຍາດນິວຄາເຊິນຍັງສາ ມາດປ້ອງກັນໄດ້ ໂດຍການໃຊ້ຢາວັກຊີນ.

• ວິທີໃຊ້ຢາວັກຊີນ

ສຳລັບວັກຊີນ ນິວຄາເຊິນ ອາຍຸອ່ອນ ແກ້ວ 100 ເຂັມ ປະລິມ ັນນ້ຳກັນ 10 ເຊເຊ, ສັ່ນໃຫ້ລະລາຍດີກ່ອນນຳໄປຢອດ, ໃຊ້ ຢອດໂກ່ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 1 ຫາ 7 ວັນ, ໃຊ້ຢອດຕາ ແລະດັງ ໂຕ ລະ 2 ຫາ 3 ຢອດ.



ຮູບ: ສະແດງການຢອດຕາໂກ່ອາຍຸ 1 ຫາ 7 ວັນ

• ການເກັບຮັກສາ ແລະການເຄື່ອນຍ້າຍ ວັກຊີນ

ສຳລັບການເກັບຮັກສາ ແມ່ນຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະ ພູມ 4 ອົງສາ, ສາມາດກຸ້ມໄດ້ 3 ເດືອນ, ຕ້ອງໃຫ້ວັກຊີນຢູ່ໃນ ຄວາມເຢັນຕະຫຼອດເວລາ, ສ່ວນການເກັບຮັກສາໃນອຸນຫະ ພູມ 30 ອົງສາ, ຈະສາມາດກຸ້ມໄດ້ 1 ປີ, ໃນເວລາເຄື່ອນຍ້າຍ ວັກຊີນຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຄວາມເຢັນບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ. ແນະນຳ ໃຫ້ໃຊ້ກະຕິກນ້ຳກ້ອນ ໃນການເຄື່ອນຫຍ້າຍຈະເປັນການດີ, ຖ້າບໍ່ມີກະຕິກນ້ຳກ້ອນເຮົາກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ຕົ້ນກ້ວຍເຊັ່ນ: ຕັດເອົາຕົ້ນກ້ວຍມາເຈາະເປັນຮູ ເອົານ້ຳກ້ອນໃສ່ແລ້ວນຳ ຢາວັກຊີນລົງໃສ່ ເອົາກາບກ້ວຍປົກ ແລ້ວໃຊ້ເຊືອກຟາງມັດ ແລ້ວກໍ່ສາມາດເຄື່ອນຫຍ້າຍໄດ້.

• ສິ່ງທີ່ຄວນຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ

1. ຄວນໃຫ້ຢາວັກຊີນແກ່ສັດທີ່ມີສຸກຂະພາບແຂງແຮງດີ, ເພື່ອຮັບປະກັນການສ້າງພູມຄຸ້ນກັນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ
2. ຄວນສຶກສາລາຍລະອຽດການເກັບຮັກສາ ແລະການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ ຕາມຄຳແນະນຳຂອງສະລາກຢາວັກຊີນ, ແຕ່ລະຊະນິດ ເພື່ອໃຫ້ວັກຊີນມີປະສິດທິພາບດີທີ່ສຸດ ແລະເກັບຮັກສາໄດ້ດົນ
3. ຄວນນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນຕາມຄຳແນະນຳຂອງສັດຕະວະແພດເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນບໍລິເວນທີ່ມີພະຍາດສັດກຳລັງລະບາດ.
4. ຕ້ອງໃຊ້ຢາວັກຊີນໃຫ້ໝົດກ່ອນວັນໝົດອາຍຸທີ່ແຈ້ງໃນແກ້ວຢາ, ຢາໃຫ້ຢາແກ່ສັດທີ່ກຳລັງຈະຂ້າງນຳໄປເປັນອາຫານ ຢາວັກຊີນທີ່ປະສົມນ້ຳກັນແລ້ວຄວນນຳໃຊ້ໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງ, ລະຫວ່າງທີ່ນຳໃຊ້ຄວນຈະເກັບໄວ້ໃນກະຕິກນ້ຳກ້ອນ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ໃນບໍລິເວນທີ່ມີພະຍາດສັດກຳລັງລະບາດ.

• ການທຳລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການນຳໃຊ້ວັກຊີນ

- ⇒ ຢາວັກຊີນທີ່ເຫຼືອຈາກການນຳໃຊ້ ຕ້ອງຝັງແລະທຳລາຍຖິ້ມເພື່ອ ຫຼີກລ້ຽງການປົນເປື້ອນ ແລະຈະພາໃຫ້ເກີດເປັນອັນຕະລາຍໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
- ⇒ ສ່ວນແກ້ວທີ່ບັນຈຸຢາວັກຊີນນັ້ນຄວນຕົ້ມ, ເຜົາ ຫຼືຝັງ



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.
Tel/fax: 021 732 162 Mobile: 020 5526277
Email: leap@laoex.org
Email: cetdu@laoex.org

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
 ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
 ພະແນກ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
 ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ

ຂໍ້ແນະນຳ

ການປ້ອງກັນພະຍາດນິວຄາເຊິນໄກ່



ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ: **CETDU**

(ໜ່ວຍງານ ພັດທະນາຮູບແບບ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຂັ້ນສູນກາງ)

ຮ່ວມກັບ:

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)