


ວັກຊີນ ຫມາກສຸກສັດປີກ

ນິຍາມ:

ວັກຊີນຊະນິດນີ້ ປຸງແຕ່ງຈາກເຊື້ອໄວຣັດໝາກສຸກສັດປີກ ປຸກໃສ່ໄຂ່ລູກອາຍຸ 12 ມື້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເກັບເອົານ້ຳຫຼໍ່ ລ້ຽງ ແລະ ເຫື່ອຍອຸ້ມຝີກນ້ຳຫຼໍ່ລ້ຽງ ມາປຸງແຕ່ງເປັນວັກຊີນ. ບັນຈຸແກ້ວ ແລ້ວເອົາເຂົ້າຈັກຕູດແຫ້ງດ້ວຍ ຄວາມເຢັນ ໃນລະບົບສູນອາກາດ. ເປັນວັກຊີນເຊື້ອເປັນຊະນິດຝຸ່ນ.



ລັກສະນະອາການ

ຕຸ່ມໝາກສຸກຈະເກີດຂຶ້ນຕາມຫົວ, ຫອນ, ຕ້າງ, ຂອບຕາ ຮົມສິບ, ເລິ່ມຈາກຕຸ່ມນ້ອຍໆ ຄ່ອຍໄຫຍ່ຂຶ້ນເປັນສີແດງຊໍ່າ ຕໍ່ມາສຸກແລ້ວຕົກເກັດ. ບາງຄັ້ງພະຍາດນີ້ເກີດຂຶ້ນ ຫາງລະ ບົບຫຼອດລົມ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ຫາຍໃຈຍາກ ແລະ ໄກ່ນ້ອຍຕາຍ ຫຼາຍ.

ຂໍ້ແນະນຳ

ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດໝາກສຸກສັດປີກທົ່ວໄປ ທີ່ມີອາຍຸ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ (ສະເພາະໄກ່ ລາດ ແມ່ນ 10 ມື້ຂຶ້ນໄປ).

ວິທີໃຊ້

ແກ້ວ 100 ເຂັ້ມ ປະສົມນ້ຳກັນ ຫຼື ກິຊຸຣິນ ນ້ຳເກືອ 10 ມລ.



ວິທີສັກ

ເອົາເຂັ້ມຕູດເອົານ້ຳຢາ ທີ່ປະສົມແລ້ວນັ້ນ, ຢອດ ລົງບ່ອນໜຶ່ງບາງໆຂອງປີກ (ຝິນປີກ) ແລ້ວໃຊ້ເຂັ້ມແທງ ລົງ 2—3 ເທື່ອ. ຫຼັງຈາກສັກຢາ 5—6 ມື້ ຈະເຫັນຕຸ່ມໝາກສຸກເກີດຂຶ້ນຕາມບ່ອນທີ່ ສັກນັ້ນ ຖ້າບໍ່ເຫັນລັກສະນະ ຂອງ ຕຸ່ມໝາກສຸກນີ້ ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ຕ້ອງສັກຄືນໃໝ່ອີກຫຼັງຈາກ ປະສົມນ້ຳຢາແລ້ວ ຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ໝົດພາຍໃນໄລຍະ 2 ຊົ່ວໂມງ.

— ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຫຼົ້າ ຫຼື ຢາຂ້າເຊື້ອອື່ນໆ ເຊັດຕາມບໍລິເວນສັກຢາ, ກ່ອນຫຼື ຫຼັງສັກ.



ໃຊ້ເຂັ້ມແທງລົງຝິນປີກ 2—3 ຄັ້ງ

ໄລຍະຄຸ້ມກັນ

ສັດຈະມີຄວາມຄຸ້ມກັນ ຫຼັງຈາກສັກຢາໄດ້ 2 ອາທິດ ແລະ ຄຸ້ມກັນພະຍາດໝາກສຸກຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ.

ການເກັບຮັກສາ

ຮັກສາໃນອຸນນະພູມ 4 ອົງສາກຸ້ມໄດ້ 3 ເດືອນ. ໃນ ອຸນນະພູມ — 3 ອົງສາກຸ້ມໄດ້ 2 ປີ.

ເວລາຂົນຍ້າຍວັກຊີນຄວນຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເຢັນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.

ແກ້ວບັນຈຸ:

ແກ້ວໜຶ່ງບັນຈຸ 100 ເຂັ້ມ

ຕາຕະລາງ : ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ

ຊະນິດຢາວັກຊີນ	ອາຍຸສັດຕ້ອງໃຊ້	ວິທີໃຊ້	ໄລຍະຄຸ້ມກັນ
<ul style="list-style-type: none"> ຢາວັກຊີນໝາກສຸກສັດປີກ 	<ul style="list-style-type: none"> ໃຊ້ກັບສັດປີກທີ່ວໂປທີ່ມີອາຍຸ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ (ສະເພາະໂກ່ລາດແມ່ນ 10 ມື້ຂຶ້ນໄປ). 	<ul style="list-style-type: none"> ແກ້ວ 100 ເຂັ້ມປະສົມນ້ຳ 10 ເຊເຊ ແຫງຜິ້ນປີກບາງ 2—3 ເທື່ອ. 	1 ປີ

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



**ການນຳໃຊ້ຢາ
ວັກຊີນໝາກສຸກສັດປີກ**



ຄັດຈາກ: ປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ວັກຊີນສຳລັບສັດ (1997)

ຮຽບຮວງໂດຍ :

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ (CETDU)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.