


ວັກຊີນ ນິວຄາເຊັນອາຍຸອ່ອນ

ນິຍາມ:

ວັກຊີນຊະນິດນີ້ ປຸງແຕ່ງຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ນິວຄາເຊັນ ແອຟ (F) ປຸກໃສ່ໂຊ່ລູກອາຍຸປະມານ 8 ມື້. ຫລັງຈາກນັ້ນ ເກັບເອົານ້ຳຫລໍ່ລ້ຽງໂຊ່ລູກມາປະສົມກັບນົມຝຸ່ນແຍກໂຂມັນ ບັນຈຸແກ້ວແລ້ວເອົາເຂົ້າຈັກຕູດແຫ້ງດ້ວຍຄວາມເຢັນໃນລະ ບົບສູນອາກາດ. ແມ່ນວັກຊີນເຊື້ອເປັນຊະນິດຝຸ່ນ (ເຊື້ອຍິ່ງມີ ຊີວິດ).



ລັກສະນະອາການ


ໂກ່ນ້ອຍມີອາການເຫຼົ່າ, ບໍ່ກິນອາຫານ ຂົນຫຍິງມັກ ຈຸ່ມກັນເປັນໝູ່ ຫາຍໃຈຍາກ ເພາະມີນ້ຳມູກ, ນ້ຳລາຍອັ່ງ ຕາມປາກ ແລະ ລຳຄໍ ຍືດຄໍຂັ້ນເພື່ອໃຫ້ຫາຍໃຈສະດວກ, ອາຈົມທຳອິດເປັນກ້ອນ ຕໍ່ມາເປັນນ້ຳສີຂາວປົນສີນົ່ມ ຕາມ ຫາງຈະມັກມີອາຈົມ ຕິດໂລຍະ 2 — 3 ມື້ ຕໍ່ມາ ໂກ່ນ້ອຍຈະຕາຍ. ເປີເຊັນຕາຍ ມີຮອດ 100 %.

ຂໍ້ແນະນຳ:

ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດ ນິວຄາເຊັນ, ຢອດໃຫ້ໂກ່ ນ້ອຍທີ່ໄປ ອາຍຸ 0 — 7 ມື້. ຕາມທຳມະດາວັກຊີນຊະນິດນີ້ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍແກ່ ໂກ່ນ້ອຍ ແຕ່ບາງຄັ້ງຄາວອາດຈະມີປະກົດການດ້ານການ ຫາຍໃຈພາຍໃນ 4 — 5 ວັນ ແລ້ວກໍ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກ ກະຕິ ຊຶ່ງເປັນປະກົດການທຳມະດາ.

ວິທີໃຊ້:

- ແກ້ວບັນຈຸ 100 ເຂັ້ມ ປະສົມນ້ຳກັນ 10 ມລ. ສົ່ນໃຫ້ລະ ລາຍດີກ່ອນໃຊ້.
- ຢອດດັງ ແລະ ຕາເບື້ອງລະຢອດ (2 — 4 ຢອດ) ເວລາ ຢອດດັງຕ້ອງອັດດັງຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ປາກ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳຢາ ເຂົ້າໄປໃນດັງທັງໝົດ. ພາຍຫລັງປະສົມນ້ຳຢາແລ້ວຄວນ ໃຊ້ໃຫ້ໝົດ ພາຍໃນໂລຍະ 2 ຊົ່ວໂມງ.
- ຫ້າມໃຊ້ຢານີ້ໃນຝຸງໂກ່ ທີ່ກຳລັງເປັນພະຍາດ ຫາງລົມ ຫາຍໃຈ. ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຫລົ້າ ຫລື ຢາຂ້າເຊື້ອອື່ນໆເຊັດຕາມບໍ ລິເວນຢອດຢາ, ກ່ອນ ຫລື ຫລັງຢອດ.



ຢອດດັງ ຫລື ຕາ ໂກ່ນ້ອຍ ເບື້ອງລະຢອດ

ໂລຍະຄຸ້ມກັນ:

ໂກ່ນ້ອຍຈະຄຸ້ມກັນ ພະຍາດນິວຄາເຊັນໄດ້ຮອດອາຍຸ 15 ອາທິດ. ແຕ່ວ່າເພື່ອຮັບປະກັນ, ຫລັງຈາກອາຍຸໂກ່ນີ້ໄດ້ 6 — 8 ອາທິດແລ້ວ ຈະຕ້ອງສັກຢາ ນິວຄາເຊັນອາຍຸໂກ່ຕື່ມ ອີກ.

ການເກັບຮັກສາ:

- ຮັກສາໃນອຸນນະພູມ 4 ອົງສາ ກຸ້ມໄດ້ 3 ເດືອນ, ໃນອຸນ ນະພູມ (— 30 ອົງສາ ກຸ້ມໄດ້ 1 ປີ)
- ເວລາຂົນຍ້າຍວັກຊີນ ຄວນຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເຢັນ ແລະບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.

ແກ້ວບັນຈຸ: ແກ້ວໜຶ່ງບັນຈຸ 100 ເຂັ້ມ.

ຕາຕະລາງ : ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ ນິວຄາເຊິນ ອາຍຸອ່ອນ

ຊະນິດຢາວັກຊີນ	ອາຍຸສັດຕ້ອງໃຊ້	ວິທີໃຊ້	ໄລຍະຄຸ້ມກັນ
<ul style="list-style-type: none"> ຢາວັກຊີນ ນິວຄາເຊິນ ອາຍຸອ່ອນ 	<ul style="list-style-type: none"> ໃຊ້ກັບໂກ່ ນ້ອຍ ອາຍຸ 0—7 ມື້. 	<ul style="list-style-type: none"> ແກ້ວບັນຈຸ 100 ເຂັ້ມປະສົມນ້ຳກັ່ນ 10 ມລ. ຢອດດັງ ແລະ ຕາ ເບື້ອງລະ 2—4 ຢອດ). 	3 ເດືອນ

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



ການນຳໃຊ້ຢາວັກຊີນ ນິວຄາເຊິນອາຍຸອ່ອນ



ຄັດຈາກ: ປຶ້ມຄູ່ມືການນຳໃຊ້ວັກຊີນສຳລັບສັດ (1997)

ຮຽບຮຽງໂດຍ :

ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ (CETD)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :

ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)



Laos Extension for Agriculture Project
P.O. Box 9159
Vientiane, Lao P.D.R.