

# ຢາວັກຊີນ ຫຼອດລົມອັກເສບ

## ນິຍາມ:

ວັກຊີນຊະນິດນີ້ ປຸງແຕ່ງມາຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ຫຼອດລົມອັກເສບ, ປຸກໃສ່ໂຂ່ລູກ ອາຍຸ 8 — 6 ມື້. ຫລັງຈາກນັ້ນ ເກັບເອົານ້ຳຫລໍ່ລ້ຽງໃນໂຂ່ນັ້ນ ມາປຸງແຕ່ງເປັນວັກຊີນ ບັນຈຸເຂົ້າແກ້ວແລ້ວເອົາເຂົ້າຈັກດູດແຫ້ງດ້ວຍຄວາມເຢັນ ໃນລະບົບສູນອາກາດເປັນວັກຊີນເຊື້ອເປັນຊະນິດຝຸ່ນ.



## ລັກສະນະອາການ

ພະນາດນີ້ມັກຕິດໄກ່ນ້ອຍຫລາຍກ່ວາໄກ່ໃຫຍ່ ມີອາການໄອ, ຈາມເລື້ອຍໆ ຢືນຈຸ່ມກິ່ນເປັນໝູ່ ຫົວຊິ້ນເຂົ້າປົກກິນອາຫານຫລຸດຜ່ອນລົງ, ເມື່ອຍ ອ້າປາກຍ້ອນຫາຍໃຈຍາກ.


## ຂໍ້ແນະນຳ:

ໃຊ້ປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບ, ຢອດໄກ່ທີ່ວໄປ. ອາຍຸ 2 ອາທິດ ຫ້າມໃຊ້ກັບໄກ່ຜັນໄຂ່ທີ່ກຳລັງໂຂ່. ຫ້າມໃຊ້ກັບຝູງໄກ່ທີ່ກຳລັງເປັນພະຍາດທາງລະບົບຫາຍໃຈ.



## ວິທີໃຊ້:

- ແກ້ວ 50 ເຂັ້ມ ປະສົມນ້ຳກິ່ນ 50 ມລ. ສັ່ນໃຫ້ລະລາຍກ່ອນໃຊ້.



ຢອດດັງ ແລະ ຕາເບື້ອງລະຢອດ

- ຢອດດັງ ແລະ ຕາເບື້ອງລະຢອດ ( 2 — 4 ຢອດ ) ເວລາຢອດຕ້ອງອັດດັງ ແລະ ປາກຂອງໄກ່ເບື້ອງໜຶ່ງ ນັ້ນໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຢາເຂົ້າໄປໃນດັງນັ້ນໝົດ.
- ຫລັງຈາກປະສົມນ້ຳຢານັ້ນແລ້ວຄວນໃຊ້ໃຫ້ໝົດ ພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງ.
- ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຫລື້າ ຫລື ຢາ ຂ້າເຊື້ອອື່ນໆ ເຊັດຕາມບໍລິເວນຢອດຢາ, ກ່ອນ ຫລື ຫລັງຢອດ.

## ໄລຍະຄຸ້ມກັນ:

ສັດຈະຄຸ້ມກັນພະຍາດ ຫຼອດລົມອັກເສບໄດ້ 6 ເດືອນ.

## ການເກັບຮັກສາ:

- ຮັກສາໃນອຸນນະພູມ 4 ອົງສາ ກຸ້ມໄດ້ 3 ເດືອນ, ໃນອຸນນະພູມ ( — 30 ອົງສາ ກຸ້ມໄດ້ 1 ປີ )
- ເວລາຂົນຍ້າຍວັກຊີນ ຄວນຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມເຢັນ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ.

**ແກ້ວບັນຈຸ:** ແກ້ວໜຶ່ງບັນຈຸ 50 ເຂັ້ມ.

**ຕາຕະລາງ :** ການນຳໃຊ້ ຢາວັກຊີນຫຼອດລົມອັກເສບ

ຊະນິດຢາວັກຊີ	ອາຍຸສັດຕ້ອງໃຊ້	ວິທີໃຊ້	ໄລຍະຄຸ້ມກັນ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ຢາວັກຊີນ ຫຼອດລົມ ອັກເສບ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ໃຊ້ກັບໂກ່ 2 ອາທິດ ຫາ 1 ເດືອນ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ແກ້ວ 50 ເຂັ້ມປະສົມນ້ຳ 50 ນລ. (ຢອດດັ່ງ, ຕາ 2 — 4 ຢອດ)</li> </ul>	6 ເດືອນ




**Laos Extension for Agriculture Project**  
**P.O. Box 9159**  
**Vientiane, Lao P.D.R.**

ກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ  
 ພະແນກສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ



# ຢາວັກຊີນ ຫຼອດລົມອັກເສບ



ຄັດຈາກ: ປຶ້ມຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ວັກຊີນສຳລັບສັດ (1997)

ຮຽບຮຽງໂດຍ :  
 ໜ່ວຍງານຝຶກອົບຮົມສົ່ງເສີມ ຂັ້ນສູນກາງ (CETDU)

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ :  
 ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ກະສິກຳ (LEAP)